

# Fabogesic Plus

Ibuprofeno 400 mg  
Cafeína 100 mg

Cápsula blanda

**Venta libre**

Vía de administración: Oral

**Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.**

## 1. ¿Qué contiene FABOGESIC PLUS?

Cada cápsula blanda contiene:

Ibuprofeno 400 mg, Cafeína 100 mg. Excipientes: Polietilenglicol 400 142 mg; Polietilenglicol 600 142 mg; Polivinilpirrolidona K30 20 mg; Hidróxido de potasio 40 mg; Agua purificada c.s.p. 900 mg; Cubierta: Gelatina 239,125 mg; Glicerina destilada 55,627 mg; Agua purificada 27,8 mg; Metilparabeno sódico 0,83 mg; Propilparabeno sódico 0,156 mg; Sorbitol 70% 55,627 mg; Dióxido de titanio 2,21 mg; Colorante amarillo ocaso C.I. 15.985 0,26 mg.

### Acciones:

Analgésico - Antiinflamatorio.

## 2. ¿Para qué se usa FABOGESIC PLUS?

FABOGESIC PLUS es ibuprofeno más cafeína y está indicado para el alivio sintomático de dolores (menstruales, de espalda, de cabeza, tratamiento del dolor de intensidad leve a moderada, musculares, de dientes), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

## 3. ¿Qué personas no pueden recibir FABOGESIC PLUS?

**No tome FABOGESIC PLUS si:**

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros medicamentos similares conocidos como AINES, a la cafeína o a otros ingredientes de la fórmula.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago, perforación o sangrado del estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros AINES, incluyendo los inhibidores de la COX-2, corticosteroides, anticoagulantes (como Warfarina), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (medicamentos para la depresión) a menos que sea indicado por un médico.
- Padece alguna enfermedad del hígado, riñones o corazón.

## 4. ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

**Tenga especial cuidado con FABOGESIC PLUS si:**

- Es mayor de 65 años.
- Tiene: asma o alergia; presión arterial alta; ciertos problemas circulatorios; problemas de estómago o ha tenido recientemente una cirugía de estómago.
- Si Usted padece problemas intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn o padece una enfermedad mixta del tejido conectivo ejemplo lupus eritematoso sistémico. Si Ud. recibe algún otro medicamento, o está intentando quedar embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
- Por contener glicerina como excipiente, puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.
- Por contener Metilparabeno y Propilparabeno como excipiente, en raras ocasiones pueden darse reacciones inmediatas de urticaria y broncoespasmos.
- Este medicamento contiene 55,627mg de Sorbitol como excipiente por unidad de dosis, por lo que puede causar molestias de estómago y diarrea. No utilizar en pacientes con intolerancia

hereditaria a la fructosa.

Este medicamento contiene colorante Amarillo ocaso como excipiente y puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

### Advertencias especiales y precauciones de uso:

Enmascaramiento de síntomas de infecciones subyacentes

FABOGESIC PLUS puede enmascarar síntomas de infección, lo que puede llevar a un retraso en el inicio del tratamiento apropiado y de este modo al empeoramiento de las consecuencias de una infección.

Infecciones:

FABOGESIC PLUS puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es importante que FABOGESIC PLUS pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si Usted:

- Presenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de problemas respiratorios o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara; erupción en la piel o descamación, o úlceras en la boca; empeoramiento de su asma; moretones o sangrado inusual, fiebre, dolor de garganta, úlceras en la boca, palidez extrema o debilidad; problemas de hígado incluyendo ictericia (los síntomas pueden incluir coloración amarillenta en piel y ojos).
  - Desarrolla úlcera en el estómago, vomita sangre o arenilla marrón (como borra de café) o tiene materia fecal negra.
  - Empeora una enfermedad intestinal preexistente como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.
  - Si Usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Este medicamento contiene cafeína. Evite tomar en exceso bebidas que contienen cafeína (por ej., té, café, bebidas enlatadas que contienen cafeína) cuando toma este medicamento. Tomar cafeína en exceso puede resultar en dificultad para dormir, nerviosismo, temblores y molestias en el pecho causadas por palpitaciones.

### ¿Cómo se usa este medicamento?

Debería utilizarse la dosis efectiva más baja por el menor período de tiempo necesario para el alivio de síntomas.

Adultos y niños mayores de 12 años: Uso oral únicamente.

La dosis inicial recomendada es de 1200 a 1800 mg de ibuprofeno por día

divididos en dosis, preferentemente con o luego de las comidas.

En caso de ser necesario la dosis puede ser aumentada a 2400 mg de ibuprofeno.

Dosis máxima diaria: 2400 mg de ibuprofeno/día.

No exceda la dosis máxima indicada. No tomar con otros productos conteniendo ibuprofenos u otros AINES. Intervalo mínimo entre dosis: 6 horas. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?

### Si usted toma más FABOGESIC PLUS del que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosis adicional, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel.: (011) 4961 8447**

### ¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT responde, al teléfono 0800-333-1234. \*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

### 5. ¿Cómo conservar FABOGESIC PLUS?

Conservar a temperatura entre 15 °C y 30 °C, lejos de la luz directa y el calor.

#### Presentaciones:

Envase conteniendo 10 cápsulas blandas.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

1008734

Emisión: 11/23

Revisión: 07/22

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 59.635

Elaborado en Argentina

En Paraguay: Importado por Savant Pharm Paraguay S.A.,

Benjamin Coanstant 835, Asunción, Paraguay.

Regente Farm. Lidia Flor Luna R.P.N° 2.982.

Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Cert. N° EF-001844-01

☎ 0810 · 444 · 32267

🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

The logo for SAVANT features the word "SAVANT" in a bold, sans-serif font. Above the letter "V", there is a stylized graphic of three vertical lines of varying heights, resembling a flame or a signal tower.