

# Fabogesic Aliv

Paracetamol 650 mg

Comprimidos

Vía de administración oral

**Venta libre**

**Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.**

## ¿Qué contiene FABOGESIC ALIV 650?

Cada comprimido de FABOGESIC ALIV 650 contiene:

Paracetamol ..... 650,00 mg

Excipientes: Almidón pregelatinizado 43,34 mg; Povidona K 30 3,61 mg; Ácido esteárico 3,61 mg; Almidón carboximetil sodico 7,22mg; Almidón de maíz 14,45 mg.

## Acciones:

Calma el dolor. Baja la fiebre.

## ¿Para qué se utiliza FABOGESIC ALIV 650?

FABOGESIC ALIV 650 está indicado para el alivio sintomático del dolor leve a moderado incluyendo dolor de cabeza, migraña previo diagnóstico médico, dolor de muelas, dolor de garganta, dolores menstruales, dolores musculares, alivio sintomático de los dolores reumáticos, estados gripales y/o resfriados, y para reducir la fiebre.

## ¿Qué personas no pueden utilizar FABOGESIC ALIV 650?

NO USE este medicamento si usted:

Es alérgico a alguno de los ingredientes, o si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.

## ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

Consulte a su médico si usted:

- Tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- Es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra.
- Tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- Está embarazada o está dándole el pecho a su bebé.
- Tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, o consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomarlo.
- Tiene dificultad para digerir ciertos azúcares como la lactosa (insuficiencia de lactasa, galactosemia o síndrome de malabsorción glucosa/galactosa).
- No debe excederse la dosis indicada. El paracetamol puede

producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.

- No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol (como algunos antigripales) conjuntamente con este producto.
- Tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que paracetamol puede alterarlas.
- Toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes (acenocumarol o Warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el corazón (propranolol) o para alguna otra enfermedad crónica.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

## ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos, FABOGESIC ALIV 650 puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.

Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que paracetamol puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos. Suspense su uso y consulte a su médico si aparece:

- dolor de cabeza,
- cambios en la orina (color o cantidad),
- ganas de vomitar (nauseas),
- mareos o inestabilidad,
- cansancio, sueño, nerviosismo,
- erupciones o picazón en la piel,
- piel amarillenta (ictericia),
- dolor en la panza (dolor abdominal).

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspense el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

**Si el dolor persiste por más de 5 días o empeora o si la fiebre persiste por más de 3 días o empeora consulte a su médico.**

## ¿Cómo se utiliza este medicamento?

FABOGESIC ALIV 650 es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua.

Como posología habitual se aconseja:

-Adultos, ancianos y niños mayores de 12 años de edad: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg).

- Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

Si usted se olvidó de tomar FABOGESIC ALIV 650, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar al menos 4 horas antes de la próxima toma.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspense inmediatamente y consulte a su médico.

## ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más FABOGESIC ALIV 650 de lo indicado en

este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas.

**Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones**

**Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.**

**Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.**

**Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel: (011) 4808-2655.**

**Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.**

**Presentaciones:**

Envases conteniendo 30 y 90 comprimidos.

**Conservación:**

Conservar este medicamento en su envase original a una temperatura inferior a 30 °C.

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO  
Y/O FARMACÉUTICO.**

1008709

Emisión: 12/23

Revisión: 06/22

SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N°19, Km 204  
Córdoba, CP: X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico  
E.M.A.M.S. Certificado N° 48.123  
Elaborado en Argentina

☎ 0810 - 444 - 32267  
🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

The logo for SAVANT, featuring the word "SAVANT" in a bold, sans-serif font. Above the letter 'A', there is a stylized graphic element consisting of three vertical lines of varying heights, resembling a flame or a signal tower.