

Fabogesic Aliv 2%

Paracetamol

Solución 2%

Vía de administración oral

Venta libre

Fórmula:

Cada 100 ml de solución contiene: Paracetamol 2,000 g, Glicerina destilada 10,000 g, Aspartame 0,100 g, Acesulfame potásico 0,045 g, Colorante rojo allura C.I 16035 0,010 g, Alcohol etílico 96% 8,129 g, Povidona 1,000 g, Esencia de frutilla líquida 0,100 ml, Metilparabeno sódico

0,137 g, Propilparabeno sódico 0,023 g, Ácido clorhídrico c.s.p pH 5-7, Agua purificada c.s.p 100,000 ml.

Contenido alcohólico: 8,129% P/V

Acción terapéutica:

Analgésico. Antifebril.

Indicaciones:

FABOGESIC ALIV está indicado para estados febriles y dolores leves a moderados en niños.

Posología y forma de administración:

Las dosis indicadas a continuación pueden repetirse de 3 a 4 veces por día.

EDAD	SOLUCIÓN
	1 cucharadita de té: 5 ml: 100 mg
Adultos y niños mayores de 12 años	5  : 25 ml: 5 cucharaditas de té

La dosis de paracetamol es de 50 mg/Kg/día.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida al paracetamol (aumento del riesgo de reacción alérgica).

Enfermedades hepáticas o hepatitis viral, trastornos funcionales, renales o alcoholismo.

Antecedentes de úlcera recurrente. Úlcera péptica activa.

Precauciones y advertencias:

No usar si el envase esta abierto o

dañado.

Cuando el dolor dura más de 5 días o cuando la fiebre persiste más de 3 días, consultar a su médico.

Se han detectado reacciones moderadas de espasmo bronquial con el uso de paracetamol en algunos pacientes sensibles a la aspirina.

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si Ud. toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte al médico antes de tomar analgésicos.

Por contener Aspartamo, la persona afectada de fenilcetonuria debe tener precaución.

Por contener Metilparabeno sódico y Propilparabeno sódico, este medicamento puede causar urticaria.

Este medicamento contiene Etanol 96 %. Cada unidad de dosificación contiene 406,45 mg de Alcohol etílico. No debe administrar en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades hepáticas, epilepsia, alcoholismo o daños o lesiones cerebrales.

Tener precaución al conducir y manejar máquinas peligrosas. Por contener Glicerina, como excipiente, puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Interacciones:

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos y eventualmente los efectos tóxicos.

El uso de paracetamol puede interaccionar con otros medicamentos tales como anticonvulsivantes (fenobarbital, difenilhidantoína, carbamacepina), por lo que de estar consumiendo alguno de estos medicamentos realice una previa consulta a su médico.

Reacciones adversas:

Erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

**Centro Nacional de Intoxicaciones
Policlínico Prof. A. Posadas - Tel.: (011)
4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de
Medicina (UBA) - Tel.: (011) 4961 8447**

Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15 °C y
30 °C, lejos de la luz directa.

Presentación:

Envase conteniendo 1 frasco por
120 ml.



**MANTENER ESTE Y TODOS LOS
MEDICAMENTOS FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA
CONSULTE A SU MEDICO Y/O
FARMACEUTICO**

Ante cualquier duda o consulta
puede comunicarse con Savant
Pharm S.A. al teléfono

0810-444-32267.

También puede hacerlo a anmat
responde, al teléfono 0800-333-1234.

1008710

Emisión: 03/24

Revisión: 07/08

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto,
Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 48.123

Elaborado en Argentina

☎ 0810-444-32267

☎ www.savant.com.ar



SAVANT

