

# CISTINA B6 SZAMA

L-Cistina 500 mg

Clorhidrato de Piridoxina 50 mg

Comprimidos recubiertos - Vía de administración oral.

**Venta libre**

## LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

### ¿QUE CONTIENE CISTINA B6?

Cada comprimido recubierto contiene:

Ingredientes activos: L-Cistina 500mg, Piridoxina HCL (Vitamina B6) 50mg. Excipientes: Croscarmelosa sódica 40,80 mg; Celulosa microcristalina 314,5 mg; Talco 29,58 mg; Estearato de magnesio 9,5 mg; Lauril sulfato de sodio 5,00 mg; Dióxido de silicio coloidal 12,00 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 16,00 mg; Polietilenglicol 6000 4,00 mg; Povidona 2,66 mg; Dióxido de titanio 7,64 mg; Amarillo ocaosa laca aluminica C.I. 15.985 0,40 mg.

### ACCIONES:

Aporte de aminoácidos azufrados y vitamina B6.

### ¿PARA QUE SE USA CISTINA B6?

CISTINA B6 SZAMA está indicado en casos de fragilidad de cabellos o uñas a partir de los 12 años.

### ¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CISTINA B6?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes o si tiene:

- Cistinuria con cálculos renales o hipersensibilidad individual a dicho componente
- Cistinosis
- Asociación con la Levodopa
- Niños menores de 12 años.

La contraindicación en tercer lugar esta asociada a la presencia de Vitamina B6 en la formulación. Su administración concurrente esta contraindicada. Se produce inhibición de la actividad de la Levodopa cuando es utilizada sin inhibidor de la Dopade-

carboxilasa periférica.

Evitar todo aporte de la Piridoxina en ausencia de un inhibidor Dopadecarboxilasa.

### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Advertencias:

Interrumpir el tratamiento en caso de reacción alérgica a alguno de los componentes de la formulación.

Evitar administrar a pacientes sensibles a la Piridoxina. Dosis de 200mg diarios de Piridoxina durante más de 30 días puede producir síndrome de dependencia a la Piridoxina.

#### Precauciones:

##### Embarazo:

La Cistina es transferida al feto a través de la placenta. El empleo de grandes dosis de Piridoxina puede producir síndrome de dependencia a la Piridoxina en el neonato.

##### Lactancia:

Considerar la relación beneficio/riesgo antes de su administración a mujeres que amamantan.

##### Pediatría:

No se han documentado problemas pediátricos.

##### Geriatría:

No se han documentado problemas geriátricos.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento

### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

- a) Los comprimidos se deberán tomar con un vaso de agua durante las comidas habituales.
- b) Se debería aconsejar que un tratamiento continuo no supere los tres meses y repetirlo según criterio médico.
- c) Se debe informar que está contraindicado en pacientes con cistinuria o cistinosis para evitar acumulación de aminoácidos de cistina en varios órganos del cuerpo. La acumulación de cistina causa complicaciones que incluyen pérdida de músculo, dificultad para ingerir alimentos, ceguera e hipotiroidismo.
- d) Se debería recomendar a los pacientes que deberán comunicar a sus médicos si están tomando Levodopa.
- e) Se debería recomendar a los pacientes que deberán comunicar a sus médicos si están amamantando o ingiriendo

estrógenos o anticonceptivos orales que contengan estrógenos.

f) Alta dosis de Piridoxina (2 a 6g por día) tomadas durante varios meses, pueden provocar neuropatía sensorial severa, pudiéndose observar andar inestable, pies entumecidos, insensibilidad y torpeza de las manos. Esta condición parece ser reversible al suspender la administración, aunque se ha observado cierta debilidad residual en algunos pacientes.

### **¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Posología:**

Para adultos y mayores de 12 años:

2 comprimidos recubiertos, 2 veces al día, durante 60 días.

No exceder dosis diaria máxima.

### **¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

#### **Si usted toma más CISTINA B6 SZAMA del que debiera**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo**

**Gutiérrez** Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A.**

**Posadas** Tel.: (011) 4654 6648

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)** Tel.:

(011) 49618447

### **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACEÚTICO**

### **¿CÓMO CONSERVAR CISTINA B6 SZAMA?**

Conservar en su envase original (blíster), preferentemente entre 15° C y 30° C, en lugar seco.

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204 Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 54.459

Elaborado en Argentina.

☎ 0810 · 444 · 32267

🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)



**SAVANT**